조직구성 수성 망상증 — 1 예 보고 —

영남대학교 의과대학 내과학교실
이경희 · 현명수 · 김영조 · 심봉섭

영남대학교 의과대학 임상병리학교실
김 경 동 · 김 정 숙

영남대학교 의과대학 병리학교실
최 원 희 · 이 태 숙

서 론

조직구성 수성 망상증(histiocytic medullary reticulosis, 이하 HMR로 명함)은 급성 경과를 취하여 수 개월 내 사망하는 비교적 희귀한 질환으로 1937년 Scott와 Robb-Smith¹⁾에 의해 처음으로 서술되었고, 임상적으로는 고열, 체중감소, 임파절종대, 전신쇠약, 간 및 비장의 종대를 가져오며 빈혈 및 백혈구 감소 등을 나타내며 말기에는 자반 및 황달을 동반하고 조직학적으로 혈구를 탐식하는 비정상적인 조직구의 증식을 특징으로 하는 전신성, 침윤성, 진행성 질환이다. 이 질환은 국내에서 1971년 최등²⁾이 첫 증례를 발표하였고, 그 후 적지않은 예의 증례 발표가 있었다. 최근 보고에 의하면 그 발생 빈도가 증가 추세에 있고 항암요법에 좋은 반응을 보여주는 예가 많이 보고 되고 있다.

저자들은 영남대학교 의과대학 부속병원에 고열을 주소로 입원한 HMR 1예를 경험하였기에 문헌고찰도 함께하였다.

증 례

환 자 : 조 ○ 원

주 소 : 고열

현병력 : 환자는 평소엔 건강히 지내던 중 입원 3개월 전 부터 심한 고열과 오한이 동반되어 인근 병원에서 salmonellosis 진단하에 입원 치료를 받았으나 호전이 없어서 1987년 9월 18일 본 병원에 입원한 환자로서 골수전자, 간 조직검사, 능강천자 등

을 시행했으나 정확한 진단을 내리지 못한 상태에서 자의 퇴원 했다가 퇴원 32일만에 전신 쇠약, 고열, 오한, 호흡곤란증을 주소로 재 입원하게 되었다.

과거력 : 30년전 백선 진단 받은것 이외 특별한 병력이 없었다. 해외여행 경력없음.

가족력 : 특이 사항 없음.

이학적 소견

1차입원

전체적으로 만성병색을 보였으나 의식은 명료했었다. 입원 당시 혈압은 110/60mmhg, 맥박은 110회/분, 체온은 38.4℃, 호흡수는 23회/분이었다. 경부강직은 없었으며 임파절은 촉진되지 않았다. 안구 소견상 빈혈은 있었고 황달은 없었다. 흉부는 좌우대칭이었고 호흡시 운동장애는 없었다. 청진소견상 호흡음은 거칠었고 잡음은 들리지 않았다. 심박동수는 규칙적이었고 상당히 빨리 뛰었으나 심 잡음은 들리지 않았다. 복부소견상 간장이 4횡지, 비장이 5횡지 정도로 촉진되었다. 피부는 탈수 되어 있었고 피부색 변화(백선) 이외 홍반성 피부발진이나 자반성 변화는 없었고 관절통 등의 증상은 없었다. 신경학적 검사상 이상 소견은 없었다.

2차입원

환자는 여전히 고열과 만성병색을 보였고 안구 소견상 빈혈이 더 심해졌고 황달이 나타났다. 흉부청진상 호흡시 잡음이 들렸다. 간 및 비장은 더욱 커져 있었고 복수가 생겨 있었다. 임파절은 촉진 되지 않았다.

검사실 소견 및 방사선 소견

(1) 말초 혈액 소견 : Table 1과 같다.

(2) 간기능 검사 : Table 2와 같다.

Table 1. Complete blood count

	First admission	Second admission	After chemotherapy
WBC	2,500	1500	4,400
RBC	2,050,000	1,550,000	1,220,000
Hgb	6.5	2.5	4.1
Hct	18.5	8.0	11.6
Plt	110,000	10,000	90,000
Diff			
Poly	69	62	83
Band	14	28	4
Lymph	1	8	10
Mono	1	1	3
Eso	0	0	0
Reti	1.5%	1.0%	4.5%

Table 2. Liver function test

	First admission	Second admission	After chemotherapy
TP (g/100mg)	5.0	4.4	4.4
Alb (g/100mg)	2.3	2.0	2.0
T-Bil (mg/100dl)	1.2	6.6	2.0
D-bil (mg/100dl)	0.7	3.8	1.3
T-cho (mg/100dl)	107	49	126
GOT (iu/l)	57	43	60
GPT (iu/l)	68	45	45
LDH (iu/l)	1333	1048	1532
r-GTP (iu/l)	150	83	116
ALP (iu/l)	821	622	1729

(3) 그 외 소견은 Ca/P는 7.0/0.5 mg/100ml, BUN/Creatinin 18/0.8 mg/100dl, Na/K/Cl은 131.7/3.22/99 meq/100ml 이었다. PT는 정상이었으나 PTT는 42.7 sec로 증가(2nd 입원)되었다. 노 검사상 bilirubin이 3+로(2nd 입원) 나타났으며 Coomb's 검사, ANA, widal test, 대변 잠혈 검사, 혈액 배양, 소변배양, 골수배양 등은 모두 음성이었다. 객담 결핵균 검사도 음성이었다. 첫 입원 당시 pleural effusion이 있어서 천자를 실시한 결과 삼출액 소견을 나타냈으며, 복강내 천자도(2nd 입원시) 삼출액 소견이었다.

(4) 흉부 X-ray 소견은 1차입원시 우측폐에 흉강유수(pleural effusion)와 상부에 석회화 된 흔적이

보였고(Photo.1), 2차입원시 심장음영은 커져있었고 우측폐 하부에 흰 음영이 있었으나 수혈후 호전되었으며 빈혈에 의한 심부전증이 동반되었던 것으로 사료된다. 복부단층 촬영에서는 간장과 비장이 상당히 커져있었고 각 실질 내에서는 공간점유성 병변은 없었고 복강내 임파결의 종대도 없었다.

(5) 간 조직 소견 : 전반적으로 sinusoid가 확장되어 있었고, 포말성 세포질을 가지는 Histiocyte(Kupffer cell)이 많이 증가 되어 있었으며 이들은 1~2개의 적혈구를 탐식하고 있었다 (Photo.2).

(6) 골수 천자 소견 : 전반적으로 과세포성이었고 적혈구계와 골수구계의 증가를 보였다. 중정도의 푸른색 세포질에 한쪽으로 치우쳐 있는 비교적 둥근 과

Photo. 1. Chest PA show pleural effusion in Rt side, and old inflammatory calcification in upper lung field are seen, Rt lateral decubitus show free pleural fluid,

Table 3. PB smear, BM aspirate and Special stain.

PB smear

- (1) RBC
moderate anemia, normocytic, normochromic
- (2) WBC
leukopenia with mild monocytosis and mild toxic granulation
- (3) platelet
thrombocytopenia

BM aspirated smear

	admission	
	1st	2nd
blast	3%	2%
promyelocyte	5%	3%
myelo	7%	5%
meta	8%	5%
band	13%	5%
seg	17%	7%
lympho	9%	24%
mono	3%	4%
plasmocyte	2%	3%
pronomo	1%	2%
baso	4%	5%
poly	16%	7%
ortho	11%	15%
histiocyte		
mature	4%	4%
immature	10%	12%
WBC:Nucleated		
RBC ratio	1.7 : 1	0.9 : 1

Special stain

- (1) iron stain : +
- (2) acid phosphatase : +++
- (3) partly tartarate sensitive

Photo. 2. The live biopsy show diffuse sinusoidal dilation and perisinusoidal fibrosis. There is marked increase of histiocyte. This histiocyte phagocytosed one or two erythrocyte.

Photo. 3. Bone marrow smear show a large immature histiocyte, showed phagocytosis of some erythrocytes (x 1000).

Photo. 4. Bone marrow smear show a large immature histiocyte with phagocytosis of normoblast (x 1000).

Photo. 5. Bone marrow smear show hyperplasia of immature histiocyte in marrow particle (x 400).

색소성의 핵과 뚜렷한 핵소체와 위족을 나타내는 미성숙 조직구가 적혈구, 백혈구, 혈소판을 탐식하고 있었고, 핵이 한쪽으로 치우쳐 있고 다양한 종류의 혈구세포를 탐식하는 성숙조직구도 관찰되었다 (Photo. 3, 4, 5) 및 (Table 3).

경과 및 치료

첫 입원시 시행했던 간 조직 검사소견, 골수검사 소견과 재입원시 시행한 골 검사 소견 및 임상소견을 토대로 HMR 진단하에 병용화학요법으로(cyclophosphamide, vincristine, prednisolone)를 사용했다. 항암요법후 해열, 간, 비장종대의 소실, 황달의 호전과, 복수의 감소, 말초혈액 소견의 호전을 관찰할 수 있었으나 3주후 발열 및 간, 비장종대가 다시 나타났으며 더 이상의 항암요법에 반응하지 않고 환자는 사망하였다.

고 찰

조직구성 수성 망상증은 1939년 Scott와 Robb-Smith가 처음으로 고열, 전신쇠약, 체중감소, 임파절 종대, 간장비장의 종대, 말기에 가서는 자반과 황달 빈혈 그리고 범혈구 감소 등을 동반하는 질환으로 발표한 이래, Medullary reticulosis, Malignant leukemic reticulohistiocytosis, Aleukemic reticulosis, Histiocytic reticulosis 등으로 불려왔으며, 1966년 Rapaport⁹⁾는 비정상인 조직구의 증식에 의한 전신성, 진행성, 침윤성 질환으로 악성 조직구증다증(malignant histiocytosis)이라 기술했으며 HMR과 MH는 동일한 질환으로 생각된다. 이 질환은 국내에서 1971년 최등이 첫 증례를 발표했고 안등¹⁰⁾이 17예에 대한 임상적 고찰을 발표했으며 그 후 적지않은 증례¹¹⁻¹²⁾ 보고가 있었다.

그 원인으로서는 Serck-Hanssen와 Purchit¹³⁾은 Uganda 지방에서 14예를 보고한뒤 malaria, schistosoma 같은 기생충 질환과 여러종류의 감염성 질환이 임파내피계의 증식과 연관하다고 생각했고, Barbara 등¹⁴⁾은 virus(EB virus)가 원인이라고 관련지워 보고한 바 있고, 유전적인 요인도 관여 것으로 생각되어지나¹¹⁻¹²⁾ 확정적인 원인은 밝기 않고 있다.

질환의 연령분포로서는 Abele와 Griffin¹⁵⁾은 평균 35.7세로 보고하였고, Wranke 등¹⁶⁾은 31세로 보고 하였지만 전 연령층에서 관찰할 수 있으며 저자들의 환자나이는 46세이었다. 이 질환의 남

너 구성분포로서는 Abele와 Griffin 등¹³⁾은 남녀 비율이 2:1로 보고했고, Engstrom 등¹⁴⁾ 및 Warnke 등¹⁵⁾의 보고는 2.3:1로서 남자가 많았다.

임상증상으로서 Abele와 Griffin¹³⁾이 보고한 바에 의하면 발열, 전신쇠약감, 체중감소, 임파결종대, 간, 비장종대, 빈혈, 황달, 백혈구 감소증, 자반증이 흔하게 나타난다고 보고했고, 본 저자들의 증례에도 상기 증상이 대부분 나타났으며(Table 4.), 특히 1

Table 4. Major clinical and laboratory findings

Finding	Abele & Griffin (72:85 case)	This case
Malaise	97%	+
Weakness	96%	+
Fever	96%	+
Weight loss	80%	+
Sweat	—	—
Chest pain	—	—
Back pain	—	—
Splenomegaly	88%	+
Hepatomegaly	86%	+
Lymphadenopathy	59%	—
Pleural effusion	—	+
Jaundice	48%	+
Purpura	37%	+
Anemia	100%	+
Leukopenia	72%	+
Thrombocytopenia	72%	+
PB histiocytosis	—	—
PB erythrophagocytosis	—	—
Hyperbilirubinemia	—	+
Positive Coombs	—	—

+: positive, —: negative

차 입원시 없었던 황달이 2차입원당시 나타났는데 Warnke 등¹⁵⁾과 Marshall 등²⁰⁾에 의하면 황달은 말기 전 단계에 나타난다고 보고했다. 그외 증상으로 비출혈, 복통, 흉통, 림노, 복수, *흉강유수, 부종 등을 볼 수 있으며, 특히 Zucker 등¹⁶⁾이 보고한 바에 의하면 임파선 종대는 소아연령층에서 많이 볼 수 있으며 성인에서는 잘 나타나지 않는다고 보고했으며 본 증례에서도 나타나지 않았다.

HMR의 진단을 위한 특별한 기준이 없으나 Serck-Hanssen와 Purchit⁹⁾은 HMR의 진단을 내리기 위해서는 간장, 임파절, 비장, 골수 등의 장기중

3 가지 이상의 장기를 침범해야하고, 혈구 침식을 갖는 조직구의 침윤과, 형태학적으로 비정상적이며 좀더 악성세포의 양상을 나타내는 조직구(단 Reed-Sternberg 세포는 아닐것)의 침윤이 있어야 하며, 각 장기에서 종괴형성을 하지 말아야 한다고 보고했는데 본 증례에서도 간, 골수조직 검사에서 이러한 소견을 볼 수 있었다. Serck-Hanssen와 Purchit⁹⁾ Abele와 Graffin¹³⁾은 간 생검의 양성율이 가장 높다고 보고하였고 Warnke 등¹⁵⁾은 진단과 치료효과를 판정하는데 골수생검보다는 골수천자가 더 유용하다고 하였다. 실지 임상에서는 범혈구 감소증이 동반되어 있는 경우가 많아 간 및 비장생검을 할 수 없는 경우가 많으며 임파절의 종대가 없는 경우도 많으므로 진단은 임상증상과 골수천자 및 생검에 의존하는 경우가 많다. 그러나 상기에 기술한 장기 이외에도 피부, 뇌하수체, 위장, 폐장, 근육, 신장, 갑상선, 흉선, 부신, 심장, 횡격막, 유방, 망막 등에도 침윤된다고 보고되었다¹³⁾

말초혈액 소견으로 Abele와 Graffin¹³⁾의 보고에 의하면 빈혈이 100%, 백혈구 감소가 72%, 혈소판 감소가 72%로 Serck-Hanssen와 Purchit⁹⁾의 보고와 비슷하며 말초혈액에서 이형조직구가 나타나는 비율은 15%정도 되며 어떤 경우는 전혀 발견되지 않아¹⁷⁾ 말초혈액에서의 이형조직구의 출현여부는 큰 의미가 없다고 보고하였고, Chih-Fei 등²⁰⁾은 비록 빈도는 적지만 말초혈액에서 비정상적인 조직구를 관찰 하였다고 하여 악성 조직구증이 의심되는 환자에서 말초혈액의 Buffy coat 도말은 골수천자와 함께 반드시 시행해 볼만한 검사임을 시사했다.

최근에는 세포화학적 검사, 전자현미경 및 면역화학검사의 도움으로 여러가지 악성질환의 세포기전이 밝혀지고 있다. 세포화학검사에서 Huhn와 Meister²¹⁾ Ducatman 등²²⁾은 악성조직구증다층시 증식하는 세포들이 acid phosphatase 및 nonspecific esterase에 대해 양성반응 보인다고 보고했고, Lampert 등²³⁾은 전자현미경하에서 성숙 단핵구 및 성숙 대식세포의 특징을 보이는 일련의 세포들을 관찰함으로써 악성 조직구증다층시 단핵구의 기원이라는 설을 뒷받침하였고, Watanabe 등²⁰⁾은 S-100 protein, lysozyme 및 non-specific cross reacting antigen with carcinoembryonic antigen (NCA)에 대한 면역 화학검사를 시행해서 단핵구 및 조직구의 분화는 Monocyte-Macrophage system으로부터 분화된다고 보고했다. 세포화학적 염색 방법으로는 Acid phosphatase, Alpha-naphthyl butyrate esterase, Alpha-naphthyl acetate esterase 등을 들 수

있고 Immunoperoxidase 법을 이용한 미성숙조직구의 세포질내 Lysozyme 또는 Alpha-antitrypsin을 증명하는 방법에 대한 진단적 가치가 보고되고 있으나 저자에 따라 서로 다른 전례를 보이기도 한다.^{26,27,30)}

이 질환의 예후는 급속히 악화 사망하는 경과를 밟는 질환으로 처음 증상이 나타나서 사망기간은 4~6개월로 알려져 있고,³⁰⁾ Rapapport 등³¹⁾은 67%에서 6개월내에 사망한다고 보고하였으며 주된 사망원인은 감염과 출혈이라고 하였다.

조직구성 수성망상증의 치료성적 및 장기생존율은 매우 불량하며 여러 단일 및 병용 약물요법에 대부분 실패하거나 단기간의 완해 상태를 보일 뿐이나,^{6,13,32)} 1975년 Warnke 등¹⁹⁾이 29예의 HMR환자에서 전신임파절 방사선요법과 cyclophosphamide로 8년간의 생존한 예를 보고하였고, Stein 등¹⁰⁾은 (COPP), Lampert 등²¹⁾은 (CHOP), Kero 등²²⁾은 (COP), Ho 및 Todd 등²³⁾은 (CHOP)의 병용 약물요법으로 완해 및 장기생존율을 보인 예를 보고하였고, 그 후 1980년 Zucker 등¹⁶⁾은 22예의 HMR환자 중 9예에서 21~49개월의 완해로 고무적인 결과를 보고한 바 있다. 비장적출술의 치료효과는 논란이 많으나 Kero 등²²⁾은 비장적출술을 시행

함으로써 진단의 정확성을 나타낼 수 있고 약물요법 시작전에 탐식작용에 의해 전혈구 감소증을 유발시키는 조직구를 많이 제거함으로써 약물요법의 치료를 상승시킬 수 있다고 보고하였다.

저자의 증례에서는 COP(cyclophosphamide, vincristine, prednisolone)의 병용약물요법으로 해열, 간장 및 비장종대의 소실, 황달 및 복수감소, 말초혈액의 호전 등의 소견을 볼 수 있었으나 3주후 다시 발열 및 간, 비장종대가 나타났으며 화학요법에 더 이상 반응하지 않았고 환자는 사망하였다. 열이 난 시기부터 추정해 보아 생존기간이 약 6개월 정도로 추정되었다.

감별진단으로는 장티푸스, Brucellosis, 아급성, 세균성, 심내막염 등과 같은 세균성 질환과 Virus성 질환, 속립성 결핵, 전신성 진균증 등이 있는데 이 질환들은 임상적 소견과 병리학적 소견으로 감별진단이 용이하며 Letter-Siwe disease, Atypical Hodgkin's disease 등의 악성종양과 감별진단이 필요하며,³³⁾ virus associated hemophagocytic syndrome (VAHS)와의 감별진단과(Table 5), Self healing reticulohistiocytosis, atypical histiocytosis 등도 감별해야 할 질환이다.

결론적으로 조직구성 수성 망상증은 흔히 잘못 판

Table 5. VAHS and Malignant Histiocytosis compared:morphologic characteristics

	VAHS	MH
Bone marrow involvement	2-4+	0-2+
Proliferative cell type	Mature histiocyte with benign cytologic characteristics	immature cell with malignant cytologic characteristics
Hemophagocytosis	3-4+	0-1+
Cytochemistry acid phosphatase (tartarate sensitive)	4+	3-4+
Nonspecific esterase (fluoride sensitive)	4+	3-4+

VAHS : virus associated hemophagocytic syndrome,

MH : malignant histiocytosis

단되기 쉬운 질환이므로 임상적 특징의 파악과 엄격한 세포학적 진단기준으로 조기진단과 조기의 강력한 병용화학 치료를 시행하면 생존기간을 연장시킬 수 있는 것으로 사료된다.

요 약

본 저자들은 최근 영남대학교 의과대학 부속병원에 입원한 46세 남자 환자로써 임상소견, 검사실소견, 간 조직검사, 골수검사 및 특수염색에서 조직구

성 수성 망상증으로 진단된 1예를 경험하였기에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.

참 고 문 헌

1. Scott, R.B., and Robb-Smith, A.H.T. Histiocytic medullary reticulosis. Lancet, 2 : 194, 1939.
2. 최영희·조한익·김용일·김상인 : 악성 조직구 증가증. 대한혈액학회지, 6:13, 1971.

3. Rappaport, H. : Tumors of the hematopoietic system : Atlas of tumor pathology. Washington DC, AFIP., 1966, pp. 49~64.
4. 안규리 · 윤휘중 · 권인순 · 최강원 · 박선양 · 김병국 · 김로경 · 이문호 · 조한섭 · 신성식 · 김용일 : 조직구성 수성 망상증의 임상적 고찰, 대한내과학회잡지, 27:552, 1984.
5. 김화숙 · 전광수 · 이학중 · 박문향 · 박효숙 : 조직구성 수성 망상증 1례, 대한혈액학회잡지, 13 : 59, 1978.
6. 정관섭 · 김교순 · 윤도광 · 김병길 · 김길영 · 김병수 · 권태정 · 최인준 : 조직구성 수성 망상증 3례 보고 및 문헌적 고찰. 소아과, 23:833, 1980.
7. 이경자 · 최태란 · 손영애 · 천경숙 · 박이갑 · 김문경 · 강득용 : 조직구성 수성 망상증 : 증례보고, 대한내과학회지, 16: 659, 1973.
8. 김광호 · 안지옥 · 김병수 · 김길영 · 이동화 · 최인준 : 조직구성 수성 망상증 : 증례보고 및 문헌적 고찰. 소아과, 21: 403, 1978.
9. Serk-Hanssen, A., and Purchit, G.P. : Histiocytic Medullary Reticulosis : Report of 14 cases from Uganda. Br. J. Cancer, 22 : 506, 1968.
10. Barbara, R.S., Fred, R., Stanley, L.L., and Marvin, D.K. : Histiocytic medullary reticulosis: Fetal hemorrhage due to massive platelet phagocytosis. Arch. Int. Med., 129 : 109, 1972.
11. Boake, W.C., Card, W.H., and Kimmey, J.F. : Histiocytic Medullary reticulosis : Concurrence in father and son. Arch. Intern. Med., 116 : 245, 1965.
12. Woo, S.Y., Kalppenbach, R.S., McCullas, G.M., Kerwin, D.M., Rowden, G., and Sinks, L.F. : Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis : Treatment with vinblastine-loaded platelets. Cancer, 46: 2566, 6180.
13. Ablele, D.C., and Griffin, T.B. : Histiocytic medullary reticulosis. Arch. Derm., 106: 319, 1972.
14. Engstrom, M.P.F., Aeling, L.J.L., and Surunga, M.D.W.R. : Histiocytic medullary reticulosis with cutaneous lesions. Arch. Dermatol., 106: 369, 1972.
15. Warnks, R.A., Kim, H., and Dorfman, R.F. : Malignant histiocytosis (histiocytic medullary reticulosis) : Clinicopathologic study of 29 cases., Cancer, 35: 215, 1975.
16. Zucker, J.M., Caillaux, J.M., Vanel, D., and Gerard-Marchant, R. : Malignant histiocytosis in childhood: Clinical study and therapeutic results on 22 cases. Cancer, 45: 2821, 1980.
17. Roger, A., Warnke, M.D., Hun, Kim M.D., and Ronald, F.D., M.D. : Malignant histiocytosis (Histiocytic medullary reticulosis), Clinico-pathologic study of 29 cases. Cancer 25: 215, 1975.
18. Zak, F.G., and Rubin, E. : Histiocytic medullary reticulosis. Am. J. Med., 31: 813, 1961.
19. Stein, R.S., Moran, E.M., and Byrne, Jr., G. E. : Malignant histiocytosis: Complete remission with combination chemotherapy. Cancer, 38: 1083, 1976.
20. Palazzo, E., Bergerat, J.P., Vetter, J.M., Boilletot, A., Lang, J.M., and Oberling, F. : Combination chemotherapy of malignant histiocytosis. Acta haemat., 62: 251, 1979.
21. Lampert, I.A., Catovsky, D., and Bergier, N. : Malignant histiocytosis: A clinico-pathological study of 12 cases. Br. J. Hemat., 40: 65, 1978.
22. Kero, R.P., Rajamaki, A., Ekfors, T., Vilkkil, P., and Nordman, E. : Case report: Malignant histiocytosis. Acta Paediatr. Scand., 66 : 249, 1978.
23. Faith, C.S., and Todd, D. : Malignant Histiocytosis, Report of Five Chinese Patients. Cancer, 42: 2450, 1978.
24. Marshall, A.H.E. : Histiocytic medullary reticulosis. J. Pathol. Bacteriol., 71: 61~71, 1956.
25. Lynch, E.C., Alfrey, C.P. Jr. : Histiocytic medullary reticulosis hemolytic anemia due to erythrophagocytosis by histiocytes. Ann. Intern. Med., 63: 666~671, 1965.
26. Huhn, D., Meister, P. : Malignant histiocytosis, Morphologic and cytochemical findings. Cancer, 42: 1341, 1978.
27. Ducatman, B.S., Wick, M.R., Morgan, T.W., : Malignant histiocytosis: A clinical, Histologic, and immunohistochemical study

- of 20 cases. *Hum. Pathol.*, 15 : 368, 1984. 984.
28. Watanabe, S., Nakajima, T., Shimosato, Y. : Malignant histiocytosis and Letterer-Si-
ure disease. Neoplasms of T-zone histioc-
yte with x100 portein. *Cancer*, 51 : 1412, 1983.
1983.
29. Chih-Fei, Y., Chung-Hong, T., Hua-Teh, N.,
: Histiocytic medullary reticulosis, *Chin-
med. J.*, 80 : 466, 1960.
30. Carbone, A., Micheau, C., Caillaud, J. M.,
A cytochemical and immunohistochemical
approach to malignant histiocytosis. *Cancer*,
47 : 2862, 1981.

— Abstract —

Histiocytic Medullary Reticulosis

— A case report —

Kyeong Hee Lee, Myung Soo Hyun, Young Jo Kim, and Bong Sup Shim

*Department of Internal Medicine,
College of Medicine, Yeungnam University*

Kyeong Dong Kim, and Chung Sook Kim

*Department of Clinical Pathology,
College of Medicine, Yeungnam University*

Won Hee Choi, and Tae Sook Lee

*Department of Pathology
College of Medicine, Yeungnam University
Taegu, Korea*

The term histiocytic medullary reticulosis first was introduced by Scott and Robb-Smith. It is a clinicopathologic syndrome characterized by wasting, fever, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, pancytopenia, and is often accompanied by jaundice, purpura. Cardinal pathologic features are systemized proliferation of atypical, neoplastic, erythrophagocytic histiocyte. We are here reporting one case which considered compatible for HMR, with a few elementary reviewed literatures.