Arnold-Chiari 기형의 1례

영남대학교 위과대학 산부인과학교실

김종호 · 김병석 · 이미나 · 이두진 · 이승호

서 론

Arnold-Chiari 기형은 후뇌의 기형으로 거의 대부분의 경우에서 수두증과 수막척수류가 동반된다¹⁻³⁾. Chiar⁴⁾가 1891년에 처음 보고하였고 1896년에는 선천성 수두증을 가진 후뇌기형을 4가지 유형으로 나누었다⁵⁾. 유형 1은 대공부위보다 아래로 소뇌편도만 전위된 것이고 유형 2는 대공 부위보다 아래로 소뇌충부엽, 제4뇌실, 하뇌간등이 전위된 것이고 유형 3은 상경추부 수막류내로 소뇌와 수질이 하전위된 것이며 유형 4는 소뇌 형성부전증이다. 저자들은 본원 산부인과에서 임신과 동반된 Arnold-Chiari 기형 1예를 경험하였기에 이에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.

증 례

환자 : 박○옥, 여자 29세

출산력 : 2-○-○-1

월경력 : 초경은 15세에 있었고, 생리주기는 30일로서 비교적 규칙적이었으며, 양은 중등도였고, 월경통은 없었다. 최종 월경일은 1989년 3월 27일이었으며, 분만 예정일은 1990년 1월 3일 이었다.

기왕력 : 특기 사항 없음

가족력 : 특기 사항 없음

현병력 : 임신 40주된 만삭 경산부로서, 첫 아기는 진통 2기 연장으로 질식 흡인분만 하였고 몸무게 3.35kg, 키 50cm인 남아였다. 두번째 임신시 개인 의원에서 산전 진찰을 받던 중 양수과다증이 있다는 이야기를 듣고, 1990년 1월 5일 본원 산부인과로 내원하여 초음파검사상 양수과다증 및 태아 수두증이 관찰되어 자세한 점진 및 분만을 위해 1990년 1월 7일 입원하였다.

초진소견 : 영양상태는 양호하였으며 혈압, 맥박, 체온은 정상범위였다. 안면 및 사지부종, 두통, 현기증 등도 없었다. 산과적 소견으로는 자궁 저부 길이가 41cm, 태아심음은 분당 140회였으며 두정위였고 양막은 건전하였으며, 자궁경관은 3cm 개대되었고, 아두는 부유하고 있었다.

검사소견 : 혈색소는 13.8g/dl, 백혈구수는 8300/mm³, 적혈구 용적은 42%였고 소변은 정상이었다. 혈청 매독반응검사는 음성이고, 산모의 혈청 α -fetoprotein치는 362ng/ml였다.

초음파 소견 : 자궁은 양수과다로 현저하게 팽대되어 있었고 태아두골이 비정상적으로 커져있었으며, 대칭적으로 커진 뇌실이 뇌실질을 두골저부를 향해 압박하고 있는 소견을 보였다. 태아 심박동은 잘 관찰되었고, 태아 체부는 두

렷한 비정상적인 소견은 보이지 않았다(그림 1).

Fig. 1. Ultrasonographic findings.

분만경과 및 소견 : 1990년 1월 7일 입원 당시 진통이 5분 간격으로 30초간 있었고, 양수천자를 시행하여 1500cc 정도의 양수를 흡인하였으며 양수의 foam stability test +3-+4 이었다. 이후 태아 심박은 처음의 비수축성 검사보다 120-130bpm으로 약간 감소되었다. 부유하던 태아 선진부는 -3으로 고정되었다. 양수천자 시행후 진통은 순조롭게 진행되어 곧 자궁개대가 완전히 이루어 졌고 분만직전 태아 심박은 60bpm 이었다. 1990년 1월 7일 11시 25분, 1분과 5분은 Apgar score가 각각 1, 1인 몸무게 1840g, 키 43cm인 여아를 분만하였다.

신생아는 분만 직후 곧장 신생아 중환자실로 옮겨졌으나 당일 11시 50분 사망하였다.

사후검진 및 부검소견 : 외관상 두부는 현저하게 커져있었고, 천문은 심하게 긴장되어 있었다. 양발의 제2, 제3 족지가 서로 융합되어 있었으며(그림 2), 제3 제4 수지가 각각 위축되어 있었고(그림 3), 왼발은 rocker bottom 양

상을 보였다. 그의 항문은 정상이었으며, 내부장기도 정상위치를 나타내었다. 하요추부에 4×2cm 크기의 피부결함이 있었는데 위치나 양상 및 병리적 검사로 보아 하요추부 수막류가 의심되었다(그림 4).

Fig. 2. Deformity of foot. Syndactyly of both 2nd and 3rd toes.

Fig. 3. Deformity of hand

Fig. 4. Rocker bottom deformity of left foot and meningocele.

Fig. 5. Gross specimen of tracheoesophageal fistula

부검소견으로는 기도와 식도사이에 누공이 보였고(그림 5), 양폐는 불완전하게 나누어져

있었다. 심장은 정상이었으며, 간은 중량이 45 g이었고 막하 출혈이 있었다(1×0.5cm). 뇌는 뇌실이 현저하게 커져 있었고 이로 인해 뇌실 질은 극히 얇아져 있었다. 소뇌에도 수두증이 있었고 이로 인해 제1경추와 제4경추사이에 위치한 소뇌실질도 종양장 두께로 얇아져 있었다(그림 6).

Fig. 6. Gross specimen of Arnold Chiari malformation. Sagittal section.

Arnold-Chiari 기형은 상부 경추관 속으로 연수와 제 4 뇌실이 하전위되며 상 연수와 하 뇌교의 길이가 길어지고 얇아지면서 이들 구조물의 미분화구조가 지속되고, 하소뇌가 대공을

통해 상 경추부로 전위되거나 대공 후두골 상 경추의 골결합들을 특징으로 하는 선천성 기형이다²⁾. 1891년 Chiari⁴⁾가 처음으로 보고하였으며, 이어 1896년에 선천성 수두증을 가진 후뇌 기형을 가진 63 예를 분석하여 다음의 4가지 유형으로 나누었다⁵⁾. 유형 1은 연수의 전위는 없이 소뇌 편도가 대공보다 아래로 전위된 것이며 유형 2는 소뇌 충부엽, 제4뇌실, 하 뇌간이 대공보다 아래로 전위된 것, 유형 3는 상 경추부 수막류내로 소뇌와 연수가 전위된 것을 그리고 유형 4는 소뇌 탈출이 아닌 소뇌형성 부전증을 보이는 경우로 구분하였다. 1894년에는 Arnold⁶⁾가 연수로 구분된 배아조직의 전위가 있는 척수낭종의 1예를 보고하였는데, 이는 Chiari 유형 2의 기형을 예증 한것에 불과하며 이후 Sochwalbe와 Gredig⁷⁾가 이들을 총칭하여 Arnold-Chiari 기형으로 명명하였다.

Arnold-Chiari 기형의 빈도는 정확하게 보고된 것은 없으나 1969년 Matson⁸⁾이 출생시 수두증을 동반한 수막척수류를 가진 모든 환자에게 있을 수 있다고 하였는데 이에 의하면 신생아 100명당 1-2명의 빈도가 된다. 여자보다 남자에서 빈도가 높으며 유형 2 기형은 수막척수류가 같은 가족적 소인이 있고 또한 다발성 요인에 의한 것으로 알려져 있다.

병인에 대한 이론으로는 첫째, 수막척수류에서 척수가 고정되면서 후뇌가 당겨지기 때문이라는 설, 둘째, 척수포막내와 두개골내의 내용물간의 조직-압력 차이에 기인한다는 설, 셋째, 수두증이 점차 커짐에 따라 후두개골내의 후두가 팽창되거나 후두개골의 골성장과 신경구조 사이의 이 때문이라는 설, 넷째, 뇌교 만곡 형성 실패, 다섯째, 능뇌의 파임 성장 등의 설이 있다⁹⁾.

조직학적 특징으로 소뇌 구조물은 심한 수초 탈락과 수초의 손실을 보이고, 과립층의 세포가 감소하며, 섬유성 성장상 세포 증식증과 이행

성증 등이 나타난다. 연수 구조는 전체적으로 길이가 길어지고, 길고 불규칙한 띠 모양의 올리브 핵을 나타내는등 왜곡된 구조를 보인다. 이분 척추가 보이고, 측뇌실과 제4뇌실이 현저하게 커지며 이로 인하여 뇌피질이 얇아지고, 투명 중격이 없거나 천공이 생기는 수도 있고, 시상 간교가 두꺼워져 양쪽 시상이 완전하게 융합되어 있는 경우도 있다. 그외 두개골골, 대뇌점 형성 부전증, 천막형성 부전증, 새의 부리모양의 시개, 소뇌, 포토모양의 중뇌 수로, 제4뇌실 정중구의 낭종, 척수 중심 수종 등의 소견도 보일수 있으며 신경계 외의 기형 즉 대혈관의 전위, 단일심방 또는 심실과 같은 심맥관계이상, 쇄항, 비뇨생식기의 기형등이 생길 수 있다^{1,2,11,12)}.

수두증과의 관계를 보면 Arnold-Chiari기형은 없이 수막척수류를 가진 수두증이 있고, 수두증이 없는 Arnold-Chiari 기형도 있으며 수막척수류가 없는 수두증을 가진 기형도 있다. 또 Arnold-Chiari 기형이 있으면서도 오히려 중뇌수로가 확장되어 있는 경우도 있어 수두증이 직접적인 병인이라고 단정 할 수는 없으나 대부분의 경우에서 수두증을 동반하는 경우가 많다^{3,11)}.

Arnold-Chiari 기형의 임상양상은 첫 증상이 나타나는 나이에 따라 다양하다. 영아기에는 주로 유형2의 증상이 많이 나타나고 유형 1의 증상은 거의 나타나지 않는다. 영아기의 유형 2의 증상을 보면 애기가 둔해 보이고, 잘 먹지 못하며, 머리를 잘 가누지 못한다. 천문이 넓고 팽팽해지면서 머리가 정상아보다 더 빠른 속도로 커진다. 신경손상으로 인한 증상으로는 후두 천음이 들리고, 갑작스런 무호흡이 있을 수 있고 안면근의 약화나, 안구진탕, 혀 근육의 약화와 근섬유속 연축, 후굴성 사경이 있을 수 있고 경련성 상지 약화로 계속 주먹을 쥐고 있거나 건반사 항진, 근육강도 증가등을 볼 수 있다.

유아기의 유형 2의 증상으로는 안구진탕, 상지의 근강도 증가와 건반사 증가, 사지와 동체의 운동 실조증, 흡인성 폐렴, 기침반사의 소실 등이 있다. 성인에서는 유형 1의 증상이 주로 나타나는데 척수 공동증의 전형적인 감각소실, 안구진탕, 두부신전시의 두통, 현훈, 목이나 어깨 혹은 팔의 타는듯한 동통, 상지와 손의 위축, 제12뇌신경 마비, 사경, 동체 운동 실조증 등이 있다^{3, 10, 11}.

Arnold-Chiari 기형과 관계된 신경 증후군의 기전으로는 첫째로 점점 커지는 수두증과 뇌의 탈출이 하부 뇌신경의 손상을 야기하며 탈출된 소뇌 조직과 대공의 전벽부 사이에서 연수가 압박을 받음으로써 신경을 손상시킨다. 또한 측뇌실과 제3뇌실이 확장되면서 점차 대뇌기능의 장애를 초래한다. 수두증은 성인기 까지도 계속 성장할 수 있으며 이로 인해 신경계의 점진적인 손상을 야기한다. 둘째는 척수 중심수종과 척수공동증의 영향이다. Arnold-Chiari 기형은 척수 중심수종과 척수공동증이 잘 동반되는데 이는 신경구에서 신경관이 잘못 형성되어 야기된다. 셋째는 점진적인 소뇌의 탈출과 위축에 의한 변화인데 탈출된 소뇌부위가 변성되고 운동실조증의 증상이 더 심해진다. 마지막으로 척수와 요-천추부 신경근의 점진적인 견인과 신장에 의해 야기되는 손상을 들 수 있다^{2, 3}.

감별진단해야 하는 것으로는 이분 척추 혹은 척추의 기형이 없는 Arnold-Chiari 기형과 소뇌와 제4뇌실 종양, 도수관 협착증, Dandy-Walker 증후군, 만성 뇌막염에 의해 이차적으로 유발되는 교련성 수두증, 지주막하 출혈의 후유증, 송과체종, 제3 뇌실의 낭종등이 있고 이들 각각은 특징적인 임상양상이 있기 때문에 결국 유형 1 기형과 구별이 가능하다. 그의 척수 공동증, 수질내의 종양, 경막외의 종양, 매독성 척수 수막염, 경추부 척추 분리, 다발성 경화증, 비

타민 B₁₂의 결핍에 의한 아급성 변성 등과 같은 척추병변등과 감별 진단이 필요하다^{3, 10, 11}.

진단방법으로는 첫째 Adams등¹³에 의해 처음으로 발표된 iofendylate 척수조영법이 있다. 이는 양와위에서 시행하는데 특징적인 소견으로는 하부로 전위된 소뇌 조직과 비틀린 척수에 의해 조영제의 상부 흐름의 저지가 나타난다. 둘째 공기 척수조영법이 있는데 이는 복와위에서 시행하여 비정상적 소견을 찾는다. 셋째는 척추 혈관 조영법으로 이는 후하 소뇌 동맥의 하부 전위를 찾음으로써 소뇌가 아래로 전위된 것을 확인하는 방법이다. 넷째 뇌척수액의 방사선동위원소 주사법이 있고, 다섯째 뇌와 경추 구조의 전산화 단층촬영과 자기공명영상에 있는데 이는 수두증과 제4뇌실의 전위를 진단하는데 가장 좋은 방법이다. 뇌척수액의 검사소견은 압력이 증가되는 것과 때로 단백질이 상승하는 것 이외에는 거의 정상적인 소견을 보인다^{3, 10, 11}.

치료로는 증상이 경미하고 진행 여부가 불확실하면 일단은 계속 관찰하는 것이며 외과적 치료로서는 유형 1 기형의 경우는 상경추부 척추궁 절제술, 대공의 후변 제거술, 후두개골저의 제거술, 대공 부위에서 하부로 전위된 소뇌 조직을 제거함으로써 뇌척수액의 흐름을 좋게 하는 방법등이 있고 이들이 불가능 할때 뇌실-심방 혹은 뇌실-복강 간의 측로를 만들어 준다^{3, 14}.

유형 II ACM의 수술 방법으로는 뇌실-심방 혹은 뇌실-복강 간의 측로를 만드는 방법이 있다³.

요 약

저자들은 본 병원 산부인과에서 최근 Arnold-Chiari 기형 1례를 경험하였기에 문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다.

참 고 문 헌

1. Peach B : Arnold-Chiari Malformation : anatomic feature in 20 cases. Arch Neurol 12(6) : 613-621, 1965.
2. Peach B : Arnold-Chiari Malformation : morphogenesis. Arch Neurol 12(5) : 522-535, 1965.
3. Salam MZ, Adams RD : The Arnold-Chiari Malformation : congenital malformation of the spine and spinal cord. Handbook of Clinical Neurology 32 : 1969 p 99-110.
4. Chiari H : Über Veränderungen des Kleinhirns, des Pons und der Medulla oblongata in Folge von congenitaler Hydrocephalie des Grosshirns. Deutsch Med Wschr 227 : 1172-1175, 1891. ; cited from Peach B : Arnold-Chiari Malformation : anatomic feature in 20 cases. Arch Neurol 12(6) : 613-621, 1965.
5. Chiari H : Über Veränderungen des Kleinhirns, des Pons und der Medulla oblongata in Folge von congenitaler Hydrocephalie des Grosshirns. Deutschr Akad Wiss Wien 63 : 71-116, 1896. ; cited from Salam MZ, Adams RD : The Arnold-Chiari Malformation : congenital malformation of the spine and cord, Handbook of Clinical Neurology 32 : 1969, p 99-110.
6. Arnold J : Myelocyte, Transposition von geweskeimen und Symbodie, Beitr Path Anat 16 : 1, 1894. ; cited from Salam MZ, Adams RD : The Arnold-Chiari Malformation : congenital malformation of the spine and spinal cord, Handbook of Clinical Neurology 32 : 1969, p 99-110.
7. Schwalbe E, Gredig M : Über Entwicklungssstörungen des kleinhirns Hirnstamms und Halsmarks bei spina bifida. Beitr Path Anat 40 : 1322, 1907. ; cited from Peach B : Arnold-Chiari Malformation : morphogenesis. Arch Neurol 12(5) : 522-535, 1965.
8. Matson D : Neurosurgery of Infancy and Childhood. Charles C Thomas, Springfield III. 1969, pp76-84.
9. Naidich TP, McLone DG, Fulling KH : The Chiari II malformation : part IV. the hindbrain deformity. Neuroradiology 25 : 179-197, 1983.
10. Oakes WJ : Chiari malformation Hydromyelia, Syringomyelia. Neurosurgery 3 : 2102-2111, 1985.
11. Masters CL : Pathogenesis of the Arnold-Chiari Malformation : the significance of hydrocephalus and aqueductal stenosis. J Neuropathol Exp Neurol 37 : 56-74, 1978.
12. Barson AJ : Spina bifida : The significance of the level and extent of the defect to the morphogenesis. Dev Med Child Neurol 12 : 129-144, 1970.
13. Adams RD, Schatzki R, Scovillo WB : Arnold-Chiari Malformation. Diagnosis, demonstration by intraspinal lipiodol and successful surgical treatment. New Eng J Med 225 : 125-132, 1941.
14. 대한신경외과학회 : 신경외과학. 중앙문화사, 서울, 1989. p 449.

—Abstract—

A case of Arnold—Chiari Malformation

Jong Ho Kim, Byeong Seog Kim, Mi Na Lee,
Doo Jin Lee, Sung Ho Lee

*Department of Obstetrics and Gynecology
College of Medicine, Yeungnam University
Taegu, Korea*

The Arnold—Chiari malformation(ACM) is an anomaly of the hindbrain consisting of two components : a variable displacement of a tongue of tissue derived from the inferior cerebellar vermis in the upper cervical canal and a similar caudal dislocation of the medulla and fourth ventricle. Hydrocephalus and meningocele are another abnormalities that associated frequently. We present a case of Arnold—Chiari malformation with hydrocephalus and meningocele and a brief review of the literatures was added.

Key Words : Arnold—Chiari malformation, Hydrocephalus, Meningocele.