Cisplatin의 신독성에 관한 연구

영남대학교 의과대학 소아과학교실

황영희 · 이경아 · 신손문 · 박용훈 · 하정옥

순천향구미병원 소아과

김춘동

성베드로영천병원 소아과

이영환

서 론

Cisplatin(cis-dichlorodiamminineplatinum)은 중금속인 platinum을 함유한 무기성 복합체로 악성 종양의 치료제로서 어른뿐만 아니라 소아에서도 널리 사용되어져 왔다.

그러나 이 약제는 신독성이 강하여 급성 혹은 만성 신부전, 신세뇨관 및 간질성 신염, 신세뇨관 기능장애와 전해질 이상 특히 신장으로의 마그네슘 손실이 나타나는 것으로 알려져 있다.

이에 저자들은 영남의료원 소아과에 입원하여 cisplatin으로 치료받은 18명의 소아암환자를 대상으로 본 약제의 신독성을 알아보고자 본 연구를 시행하였다.

cisplatin을 투여하기전과 후에 각각 혈청내 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인, 마그네슘, BUN, 크레아티닌 및 크레아티닌 청소율을 측정하여 비교하였다.

환아들에게 투여된 cisplatin의 총투여량은 체표면적당 60mg에서 120mg(평균93mg)이었으며, 투여방법은 400ml의 5% 포도당 수액에 15% mannitol을 체표면적당 1g과 혼합하여 6-8시간 동안 투여하거나, cisplatin투여전 6-8시간 동안 1500ml/m²/24hr의 용량의 충분한 수분을 공급하고 약제투여시 1500ml/m²/8hr의 수액과 15% mannitol을 혼합하여 투여하였다.

성 적

대상 및 방법

연구대상은 1986년 3월부터 1992년 4월까지 영남의료원 소아과에 입원하여 cisplatin으로 치료받은 소아암환자 중 cisplatin을 투여하기 전에 신장기능이 정상인 환자 18명을 대상으로 하여

환아들의 연령은 11개월에서 13세 사이였으며, 남아가 15명, 여아가 3명이었으며 원발질환은 신경아세포종 8례, 간아세포종 3례, 복부의 신경절아세포종 2례, 경부에 발생한 림프상피종 1례, 그리고 종격동에 발생한 혼합배아세포종 1례였다(표 1).

Table 1. Characteristics of cisplatin treated patients

Disease	No. of cases	Age(mean) yr	Sex	Dose(mg/M ²)	Cycle	Combined drug
Neuroblastoma	8	2-10(4.1)	M	90	8.5	VCR CTX VM-26 ACR
Hepatoblastoma	3	1.3-2(1.8)	M	100	7	ACR
Ganglioneuroblastoma	2	0.9-4(2.5)	M	60-90	11	VCR CTX VM-26 ADR
Lymphoepithelioma	1	8	F	100	4	ADR BLEO
Retinoblastoma	1	2.6	F	90	3	VM-26 MTX
Osteosarcoma	1	13	M	120	2	ADR
Embryonal carcinoma	1	6	F	100	6	VCR BLEO
Mixed germ cell tumor	1	7	M	100	12	VBL BLEO

VCR : vincristine CTX : cytoxan ADR : adriamycin BLEO : bleomycin

MTX : methotrexate VBL : vinblastin

Table 2. Changes of serum electrolytes concentrations and creatinine clearance after cisplatin administration

Electrolyte and Ccr	Before treatment	After treatment	P-value*
Na(mEq/L)	137.6±6.4	136.8±7.4	NS**
K(mEq/L)	4.3±0.6	3.9±0.6	NS
Cl(mEq/L)	102.5±4.0	98.5±5.2	NS
Ca(mg/dl)	9.4±0.4	8.5±1.1	NS
P (mg/dl)	5.2±0.7	4.9±0.5	NS
Mg(mg/dl)	2.5±0.4	1.9±0.7	NS
BUN(mg/dl)	9.4±2.1	12.2±5.7	NS
Cr(mg/dl)	0.5±0.2	0.6±0.3	NS
Ccr(ml/min/1.73m ²)*	122±35	119±45	NS

* by Wilcoxon signed rank test

** NS : not significant

*** Ccr : creatinine clearance

Cisplatin 투여전과 투여후의 혈청내 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인, 마그네슘, BUN 및 크레아티닌과 creatinine 청소율을 비교한 결과 cisplatin으로 치료후 칼슘, 마그네슘, 칼륨, BUN이 치료전과 다소 차이는 있었지만 통계학적으로 유의성은 없었으며, 크레아티닌과 크레아티닌 청소율도 유의할 만한 차이는 보이지 않았다(표 2).

그러나, 혼합배아세포종 환아 1례에서 심한 급성 신부전이 ($Ccr: 26ml/min/1.73m^2$) 발생하여 cisplatin의 투여를 중단한 후 회복되었으며 ($Ccr: 65ml/min/1.73m^2$), 저칼슘혈증이 신경아세포종 2례, 간아세포종 1례등 3례에서 발생하여 cisplatin의 중단후에도 상당기간동안 지속되었으며 칼슘 및 마그네슘의 경구 투여를 계속하였다.

그리고 cisplatin의 투여방법중 충분한 수액공급을 한 군에서는 전해질 이상 및 신부전이 발생된 예가 없었으나 단지 2례에서만 시행되어 충분한 수액공급을 하지 않은 군과의 비교는 실시하지 못하였다.

고 찰

Cisplatin(cis-dichlorodiammineplatinum)은 platinum원자가 chloride와 ammonia원자에 의해 둘러 싸여진 inorganic complex로서 epithelial tumor에 효과적인 항암제로 1972년 Division of Cancer Treatment of the National Cancer Institute에 의해 쓰여지기 시작했다¹⁾. 특히, 이 약제는 전이 고환암과 난소암의 치료에 좋은 효과를 나타낸다고 한다. 그외에도 방광암, 두경부의 편평세포암, 기관지암, 자궁암, 인파종에도 많이 사용되어지는 약제이다.

그러나 신독성, 골수조직 억제작용, 심한 구토, 신경 장애 및 이독성 등의 부작용이 문제

시되고 있으며, 특히 신독성이 가장 큰 부작용으로 생각되어져 왔다. Cisplatin 투여후의 신장의 조직소견은 급성기에 신장팽대와 울혈을 볼 수 있으며, 현미경 검사상 원위세뇨관과 집합관의 부분적인 괴사, 팽창, 울혈 및 호산성 물질의 침착이 관찰되고 후기에는 원위세뇨관 팽창과 초자양원주 침착 등을 보이나 사구체 및 혈관손상은 뚜렷하지 않다고 한다²⁾.

신독성의 일차적인 부위는 세뇨관으로서 응집성 괴사, 간질성 부종, 세뇨관 확장이 가장 두드러진 소견이다.

Cisplatin을 투여시 현미경적으로 상피세포의 퇴행과 근위 세뇨관의 세포 괴사가 초래되고, 근위와 원위상피내의 mitochondrial swelling을 보이게 되며 기저막이 electron dense하고 두꺼워지고 짧아지게 된다. 쉐자연(brush border)의 미세융모(microvilli)의 수가 감소하게 되고 원위세뇨관 상피세포에 electron-dense crystal이 출현하고 당원이 모이게 된다³⁾. 이러한 cisplatin의 독성효과는 이들 약제가 DNA의 nucleophilic site와의 상호작용을 통해 나타난다고 한다⁴⁾.

Cisplatin은 때로 크레아티닌 청소율을 비가역적으로 점차 감소시키고 BUN 및 혈청 크레아티닌 농도를 증가시키며, 고질소혈증은 약제 투여후 4-10일째 나타날 수 있다고 보고하고 있다. 혈청 크레아티닌의 증가없이 소변내 beta-2-microglobulin의 배설이 증가될 수 있으며 이것은 신세뇨관 손상을 시사해 준다.

또한 신세뇨관 손상으로 인한 신장을 통한 마그네슘 소실이 나타날 수 있어 저마그네슘혈증을 나타내고 저칼슘혈증을 유발하여 테타니를 동반하게 되고 때로 저칼륨혈증을 일으킨다⁵⁾.

저마그네슘혈증, 저칼륨혈증, 저칼슘혈증은 primary tubulopathy로 Gitelman에 의해 처음 기술되었다⁶⁾. 저마그네슘혈증은 신경근육계의 이상을 초래하여 무기력, 반사이상항진, 경련을 동반할 수 있으며 부정맥도 초래할 수 있다²⁾.

Cisplatin과 관계된 전해질 이상은 처음에는 dose-dependent azotemia가 먼저 보고 되어졌고⁷⁾ 신장기능의 회복은 cisplatin에 노출된 후 15-20일에 나타난다고 보고하였다.

Cisplatin의 독성은 체표면적당 50mg 이상 투여시 수액요법과 이뇨제를 병용 투여하지 않을 때에 환자의 약 20-25% 정도에서 나타난다고 한다. 특히 이 약제는 투여량과 연관된 신장 손상을 유발한다.

문헌보고에 의하면 70mg/m²를 3주마다 cisplatin을 투여받은 44명의 환자중 52%에서 저마그네슘혈증이 보고되었으나⁴⁾ 이는 대부분은 경하고 가역적이다¹⁾. 최근에는 수액요법과 mannitol 투여로 신독성을 줄이는 것이 보고되고 있다¹⁾.

만약 cisplatin 투여시 aminoglycoside 계통의 항생제 혹은 항균제인 amphotericin과 같이 치료할 시에는 신독성을 더 강화하는 결과를 초래하여 신장을 통한 마그네슘소실을 더 촉진시킨다고 한다. 그래서 사구체 여과율이 더 많이 감소하는 것을 볼수 있다.

세뇨관 피사가 동반된 경우 완전한 회복이 되지 않고 크레아티닌 청소율이 불완전하게 회복되며 이런 세뇨관 손상의 기전은 아직까지 잘 알려져 있지 않다.

Phelps⁸⁾ 등은 토끼의 신피질 절편을 이용한 연구에서 S₁ 및 S₂ segment가 가장 먼저 장애를 받으며 이후 S₃로 병변이 진행된다고 하며 그들은 이를 근거로 cisplatin이 나타내는 독작용이 Na⁺, K⁺-ATPase를 억제하여 나타날 가능성이 있음을 시사하였다. 즉 근위세뇨관의 pars convoluta는 pars recta보다 Na⁺, K⁺-ATPase를 훨씬 많이 포함하기 있기 때문에³⁾ S₃ segment 보다 S₁ 및 S₂ segment가 더 예민하게 영향을 받을 것이라고 하였다. Na⁺, K⁺-ATPase는 세포에서 sodium 및 물의 재흡수 뿐만 아니라 많은 유기 물질의 재흡수 및 분비에 중요하기 때문에 지금까지 보고된 cisplatin의 많은 신장독작용은

Na⁺, K⁺-ATPase 억제작용과 연관지어 설명할 수 있다^{9,10)}. Na⁺, K⁺-ATPase의 억제로 ATP 소모를 줄임으로써 산소소모량을 억제하는 효과를 나타낸다¹¹⁾.

이러한 cisplatin에 의한 신장 손상을 줄이기 위한 방법으로 현재 투여간격의 조절로 최소한 3주 간격을 권유하고 있으며, 충분한 수액요법, 식염수와 동반한 약제투여 및 이뇨제 투여 등이 사용되고 있으며, 이뇨제와 식염수의 사용은 cisplatin의 용량이 120mg/m²를 넘지 않으면 platinum의 신장내 축적을 감소시키고 세뇨관 상피의 접촉 시간을 줄임으로써 신장손상을 방지하는데 효과가 있을 것이라고 보고하였다¹²⁻¹⁵⁾.

다른 연구자들의 보고에 따르면 높은 농도의 chloride를 cisplatin과 함께 투여하면 toxic한 세포내 농도를 감소시킬수 있다고 보고하고 있다⁴⁾.

최근 probenecid 혹은 tolazoline, verapamil의 약제 사용으로 신세뇨관 세포에 cisplatin의 흡수를 방해하여 이 약제의 농도를 감소시키는데 유용하다는 보고가 있으나⁴⁾ 더 많은 연구가 필요할 것으로 사료된다.

Deray¹⁶⁾에 의한 쥐에 대한 실험연구에 따르면 cisplatin에 의한 신독성에 nifedipine이 biphasic dose dependent한 효과가 있으며 고용량의 nifedipine은 cisplatin 투여로 인한 신장의 전형적인 기능적, 조직병리학적 변화를 향상시키며 이런 칼슘 길항제는 사구체 여과율(GFR)를 증가시킨다고 보고하였다.

저자들의 관찰에서는 cisplatin 투여후 전해질 이상으로 저마그네슘혈증, 저칼슘혈증, 고질소혈증, 저칼륨혈증, 저나트륨혈증이 관찰 되었으며, 3명의 환자에서 저칼슘혈증으로 carpopedal spasm이 발생되어 이들 환아는 치료시마다 지속적인 마그네슘과 칼슘을 보충해 주었으며, 이들 중 한명은 약제를 바꾸어 화학요법을 시행하여야 했으며, 혼합배아세포종 환아 1례에

서도 크레아티닌 청소율의 심한 감소로 항암제의 약제를 바꾸어 화학요법을 시행하였다.

결 론

1986년 3월부터 1992년 4월까지 영남의료원 소아과에 입원하여 cisplatin으로 치료받은 18명의 소아암 환자를 대상으로 신기능에 미치는 cisplatin의 영향을 알아보기 위해 약제 투여전과 후에 각각 혈청내 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인, 마그네슘, BUN, 크레아티닌 및 크레아티닌 청소율을 측정하여 비교한 결과 칼슘, 마그네슘, 칼륨, BUN이 치료전과 다소 차이가 있었으나 통계학적으로 유의성은 없었으며 크레아티닌과 크레아티닌 청소율도 유의할 만한 차이를 보이지는 않았다. 그러나, 심한 급성 신부전증이 1례에서 발생하여 cisplatin 투여를 중단한 후 회복되었으며, 저칼슘혈증이 3례에서, 저마그네슘혈증이 1례에서 발생하여 cisplatin의 중단후에도 상당기간 지속되었으며 칼슘과 마그네슘의 경구투여를 계속 하였다.

Cisplatin은 전해질이상과 신장기능에 손상을 초래할 수 있으므로 투여후 신장기능과 전해질 이상 소견을 조기에 발견할 수 있도록 보다 적절한 검사들이 필요하며, 저칼슘혈증과 저그네슘혈증은 약제 중단 이후에도 장기간 지속될 수 있으므로 적절한 치료와 주의가 요할 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. Rozenzweig M, Daniel D, Slavik M, Franco M : Cis-diamminedichloroplatinum a new anticancer drug. *Ann Intern Med* 6 : 803-812, 1977.
2. Juan CG, Daniel MH, Eseteban C, Stephen SS : The renal pathology in clinical trials of cis-platin(2) diamminechloride. *Cancer* 39 : 1362-1371, 1977.
3. Weber BL, Garnick MB, Rieselbach RE : Nephropathies due to antineoplastic agents. *Disease of the kidney and urinary tract section b.* 818-819, 1988.
4. Earhart RH, Martin PA, Tutsch KD, Erturk E, Wheeler RH : Improvement in the therapeutic index of cisplatin (NSC 119875) by pharmacologically induced chloruresis in the rat. *Cancer* 43 : 1187-1194, 1983.
5. Lam M, David J, Adelstein : Hypomagnesemia and renal magnesium wasting in patients treated with cisplatin. *Amer J Kid dis* 8 : 164-169, 1986.
6. Gitelman HJ, Graham JB, Welt LG : A new familial disorder characterized by hypokalemia and hypomagnesemia. *Trans Assoc Arn Physicians* 7 : 221-233, 1966.
7. Blachley, Julian B, Hill : Renal and electrolyte disturbance associated with cisplatin. *Ann Intern Med* 95 : 628-632, 1981.
8. Phelps JS, Gandolfi A.J, Brendel K : Cisplatin nephrotoxicity : In vitro studies with precision cut rabbit renal cortical slices. *Toxicol Appl Pharmacol* 90 : 501, 1987.
9. 염하용, 이상호 : Effect of cisplatin on rabbit kidney cortical function *부산의대학술지* 28 : 1-8, 1989.
10. 최영환, 손경선, 이강욱, 이현영, 김산용, 신영태, 노홍규, 이복희 : Cisplatin의 신독성에 관한 연구, *대한 내과학회잡지* 32 : 410-415, 1987.
11. Ashton K. and Koepsell H. : Measurement of Na/K ATPase activity in segment of pro-

- ximal tubules from superficial and juxtamedullary rat nephrons during antidiuresis. *Pflugers Arch* 363 : 251, 1976.
12. Robert F, Ozols, Brian JC, Joan JRN : High dose cisplatin in hypertonic saline. *Ann Intern Med* 100 : 19-24, 1984.
  13. Chopra S, Kaufman JS, Chase D, Gehr MKN, Flamenbaun W : Cis-diamminedichloro-platinum acute renal failure : Relationship of dose and attempts at amelioration. *Clin Res* 28(1) : 441A Abstract, 1980.
  14. Gehr M, Chdpra S, Chase D, Flamenbaun W : The effect of furosemide on cis-diamminedichloroplatinum induced acute renal failure. *Kidney Int* 19 : 201 Abstract, 1981.
  15. Arthur H, Rossof, Robert E, Slayton, Charles P, Perlia : Preliminary clinical experience with cis-diamminedichloroplatinum (2). *Cancer* 30 : 1451-1456, 1972.
  16. Deray G, Dubois M, Beaufils H, Cacoub P, Anouar M, Jaudon MC, Baumelon A, Jouanneau C, Jacobs C : Effects of nifedipine on cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. *Clin Nephrol* 30 : 146-150, 1988.

—Abstract—

A Study of Cisplatin Nephrotoxicity

Young Hee Hwang, Kyoung A Lee, Son Moon Shin, Young Hoon Park, Jeong Ok Hah

Department of pediatrics
College of Medicine, Yeungnam University
Taegu, Korea

Chun Dong Kim
Department of Pediatrics
Soonchunhyang Gumi Hospital
Gumi, Korea

Young Hwan Lee
Department of Pediatrics
St. Peter's Yeongchun Hospital
Yeongchun, Korea

To evaluate the nephrotoxicity of cisplatin, serum levels of sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorous, magnesium, BUN, creatinine and creatinine clearance were measured before and after administration of cisplatin in 18 cases of patients with malignant neoplasm.

The results were as follows :

- 1) Serum calcium, magnesium, potassium and BUN levels were changed after cisplatin administration, but those changes were not statistically significant.
- 2) The mean value of creatinine clearance was not decreased significantly after treatment with cisplatin.
- 3) Acute renal failure was developed in one case, and four cases of hypocalcemia, hypomagnesemia were also detected after administration of cisplatin.

Key Word : Cisplatin nephrotoxicity